

## LES ROSES.

Nomenclature des variétés de cette espèce.

## ROSA SEMPERVIRENS.

R. Germinibus globosis ovatis, pedunculisque glanduloso-hispidis; caule petiolisque aculeatis; foliis glabris, nitidis simpliciter et argute serratis; floribus subsolitariis, sæpius subcorymbosis; stylis in columnam pilosam adunatis. (N.)

\* Tubes des calices globuleux.

- α. R. *Sempervirens globosa*.  
 R. (*Sempervirens*), stylis in columnam pilosam coalitis, fructibus globosis, pedicellis subsolitariis piloso-glandulosis, foliis glaberrimis, lucidis, caule scandente, seu prostrato. D.C. Cat. Hort. Monsp. p. 138. L. Sp. 704. MILL. Dict. n° 9. Hoff. Germ. 176. ROTH. Germ. 1, p. 218; 2, p. 556. Du Roi, Harbeck. 2, p. 252. ROESS. Beschrei. der Ros. 1, p. 207. NOUV. DUHAM. vol. 7, p. 26, var. α. tab. 13, fig. 1.  
 R. (*Sylvestris dumetorum*). MICHX. Cat. Plant. H. Fl. Vulg. Rosier grimpant; Rosier à feuilles toujours vertes. Fleurs blanches. Commun dans la France méridionale. M. DESCOMET a obtenu une sous-variété de ce Rosier à fleurs doubles, légèrement teintées en rose.  
 β. R. *Sempervirens Microphylla*. D.C. l. c. var. β. Ce Rosier, que M. le professeur DE CANDOLLE a trouvé dans les environs de Montpellier, présente des fleurs et des feuilles beaucoup plus petites que dans la variété précédente. Vulg. le Rosier grimpant à petites feuilles.

\*\* Tubes ovoïdes-allongés.

- δ. R. *Sempervirens ovoidea*. DESV. Journ. Bot. septembre 1813, p. 113, var. β.  
 R. (*Balearia*). DESF. Cat. Hort. P. PERS. Syn. 2, p. 49. DUMONT DE COURSET, Bot. Cult. n° 36.  
 R. (*Sempervirens*). MISS. LAW. Tab. 45. AIT. Kew. 2, p. 205. WILLD. Sp. 2, p. 1073. DC. Fl. Franc. éd. 3, n° 3714. POIR. Ency. 6, p. 293. ROESS. Roses fig. n° 32. RAU, En. Ros. p. 120. Non BAST. (On doit attribuer à notre variété α tous les synonymes produits par ces auteurs, qui se rapportent aux Rosiers de cette série qui offrent des fruits globuleux.)  
 R. (*Atro-virens*). WIV. Frag. Fl. Ital. p. 4. Tab. 6. Vulg. le Rosier de Mahon, le Rosier grimpant à fruits ovoïdes.  
 γ. R. *Sempervirens latifolia*. (N). Foliolles beaucoup plus larges et plus allongées que dans toutes les variétés de l'espèce. Tubes et pédicelles lavés d'une teinte rougeâtre. Neuf à dix fleurs blanches en bouquet.  
 R. (*Sempervirens*). ANDR. R. Cum Tab. Vulg. le Rosier grimpant à grandes feuilles. M. Isaac SWAISON avait envoyé ce Rosier d'Angleterre à M. Du ROY, qui nous l'a communiqué, ainsi qu'une sous-variété qu'il a obtenue de semis, laquelle offre des fleurs composées de huit à neuf pétales presque roses. C'est celle qu'il désigne (Choix des Roses, p. 5) sous le nom de *Sempervirens semiplena Rosea*.

Tous ces Rosiers sont originaires d'Italie; ils y donnent des fleurs presque toute l'année, principalement aux environs de Florence. Dans le climat de Paris, comme dans le nord de la France, les francs-de-pied fleurissent difficilement, sur-tout si on les soumet à la taille. Leurs pétales fournissent à la médecine un purgatif suspect: toutefois, le peuple, en Toscane, les emploie fréquemment à cet usage, mais probablement à très-petite dose.